

## Auswertung der ersten Phase des Dorfentwicklungsprojektes in Attapeu, Laos

### 1. Indikatoren zur Gesundheit

Indikator	2010	2013
Anteil der Bevölkerung mit intestinalen Parasiten	62.1%	32.5%
- in Sanxay Distrikt	84.7%	23.5%
- in Sanamxay Distrikt	53.4%	37.9%
Anteil an Kindern < 5 Jahre mit akuter Mangelernährung	20.1%	10.1%
Anteil an Kindern <5 Jahre mit chronischer Mangelernährung	47.6%	35.5%
Anteil an Kindern 5-18 Jahre mit akuter Mangelernährung	21.1%	14.7%
Anteil der Bevölkerung mit Blutarmut (HB < 11mg/dl)	18.7%	14.9%

### 2. Indikatoren zum Wissen und Verhalten

Indikator	2010	2013
Anteil der Bevölkerung, die weiß wie man Durchfall behandelt	26.8%	67.5%
Anteil der Bevölkerung, die weiß wie man Fieber behandelt	60.5%	93.6%
Anteil der Bevölkerung, die "Toiletten verwenden" als Methode zur Prävention von Durchfall angegeben hat	5.0%	20.4%
Durchschnittliche Zeit in der die Kinder ausschließlich Muttermilch trinken (in Monaten)	3.07	3.63
Durchschnittlicher Tag nach der Geburt, an dem die Kinder beginnen Muttermilch zu trinken (in Tagen)	2.0	1.5
Anteil an Frauen, die nach der Geburt eine restriktive Diät einhalten	89.9%	77.5%
Anteil an Familien, die Verhütungsmittel verwenden	26.3%	41.4%
Anteil an Familien, die regelmäßig rohes Fleisch oder rohen Fisch verzehren	60.5%	52.1%

### 3. Indikatoren zu Lebensbedingungen

Indikator	2010	2013
Anteil an Familien, die regelmäßig Toiletten verwenden	3.0%	94.1%
Anteil der Bevölkerung, die unter Moskitonetzen schlafen	92.2%	98.0%
Anteil der Bevölkerung, die mindestens einmal in einer Dorfgesundheitsstation medizinisch behandelt wurde	18.5%	69.9%
Anteil der Bevölkerung, die denkt, dass der freiwillige Gesundheitsshelfer im Dorf aktiv Patienten behandelt	83.4%	97.1%
Anteil der Bevölkerung die denkt, dass die traditionelle Geburtshelferin im Dorf aktiv hilft, Kinder zu entbinden	41.1%	92.5%